

ARTICLE ORIGINAL

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES, DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES DES PÉRITONITES PAR PERFORATION ILÉALE À L'HÔPITAL GÉNÉRAL IDRISSE POUYE

EPIDEMIOLOGICAL, DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ASPECTS OF PERITONITIS BY ILEAL PERFORATION AT THE IDRISSE POUYE GENERAL HOSPITAL

I KA, AC FAYE, A DIOP, PS DIOP

Service de chirurgie générale ; Hôpital Général Idrissa POUYE.BP 3270 Dakar

RÉSUMÉ

Introduction: La péritonite aiguë généralisée est une inflammation aiguë et diffuse de la séreuse péritonéale d'origine chimique ou bactériologique. On distingue des péritonites primitives et des péritonites secondaires. Les péritonites secondaires représentent plus de 90 % des péritonites aiguës. Plusieurs affections digestives peuvent entraîner secondairement une péritonite, parmi lesquelles la perforation iléale.

Patients et méthode: Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive 1er Janvier 2005 au 31 Décembre 2022 concernant les patients pris en charge pour péritonite par perforation iléale au service de chirurgie générale de l'hôpital général Idrissa POUYE. Les paramètres étudiés étaient les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats: il s'agit de 24 patients d'âge moyen 27,8 ans avec des extrêmes de 17 et 39 ans. La sex-ratio était de 2,4. Le délai moyen de consultation était de 73 heures avec des extrêmes de 12 et 96 heures. La douleur abdominale était diffuse dans 100% (N:24). Les vomissements étaient présents dans 75% des cas (N: 18), l'arrêt des matières et des gaz dans 70,8% des cas (N: 17). La défense abdominale et la contracture abdominale concernaient respectivement 75% et 29,16% des patients. Tous les patients avaient bénéficié d'un traitement chirurgical encadrée par la réanimation. La résection iléale et iléostomie était le geste le plus pratiqué. Trois cas de morbidité et un cas de mortalité ont été déplorés.

Conclusion: La péritonite par perforation iléale est une pathologie du sujet jeune de sexe masculin. la résection iléale iléostomie suivie d'un rétablissement secondaire de la continuité digestive donne de bons résultats.

Mots clés: péritonite, perforation iléale, fièvre typhoïde, chirurgie.

SUMMARY

Introduction: Acute generalized peritonitis is an acute and diffuse inflammation of the peritoneal serosa of chemical or bacteriological origin. A distinction is made between primary peritonitis and secondary peritonitis. Secondary peritonitis represents more than 90% of acute peritonitis. Several digestive disorders can secondarily lead to peritonitis, including ileal perforation.

Patients and method: This is a descriptive retrospective study from January 1, 2005 to December 31, 2022 concerning patients treated for peritonitis by ileal perforation in the general surgery department of the Idrissa POUYE general hospital. The parameters studied were the epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic and evolutionary aspects.

Results: there are 24 patients with an average age of 27.8 years with extremes of 17 and 39 years. The sex ratio was 2.4. The average consultation time was 73 hours with extremes of 12 and 96 hours. Abdominal pain was diffuse in 100% (N: 24). Vomiting was present in 75% of cases (N: 18), cessation of materials and gases in 70.8% of cases (N: 17). Abdominal defense and abdominal contracture concerned respectively 75% and 29.16% of patients. All patients had benefited from surgical treatment supervised by resuscitation. Ileal resection and ileostomy was the most common procedure. Three cases of morbidity and one case of mortality were deplored.

Conclusion: Ileal perforation peritonitis is a pathology in young males. Ileostomy ileal resection followed by secondary restoration of digestive continuity gives good results.

Keywords: peritonitis, ileal perforation, typhoid fever, surgery.

Tirés à part:

Pr Ibrahima KA ; Agrégé en chirurgie générale. Service de chirurgie générale ; Hôpital Général Idrissa POUYE.BP 3270 Dakar.
 Adresse Mail dribouka@gmail.com