

FAIT CLINIQUE

HERNIE DE CLAUDIUS D'AMYAND : À PROPOS DE DEUX OBSERVATIONS AU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE MARADI AU NIGER

HERNIA OF CLAUDIUS OF AMYAND: ABOUT TWO OBSERVATIONS AT THE REGIONAL HOSPITAL CENTER OF MARADI IN NIGER

H MAMAN BOUKARI^{1&}, M B ABDOULAYE², O ADAKAL², M MAIKASSOUA³, MI AMADOU⁴, A HARISSOU⁴, O HABOU⁵, J D LASSEY^{2,3}, R SANI⁵

- 1- Service de Chirurgie Générale de Centre Hospitalier Régional de Maradi/Niger
 2- Département de Chirurgie et Spécialités Chirurgicales de l'Hôpital de Référence de Maradi/Niger
 3- Service d'anesthésie réanimation de l'Hôpital de Référence de Maradi/Niger
 4- Département de Chirurgie et Spécialités Chirurgicales de l'Hôpital National de Zinder
 5- Service de Chirurgie pédiatrie de l'Hôpital National de Zinder /Niger
 6- Département de Chirurgie et Spécialités Chirurgicales de l'Hôpital National de Niamey /Niger

RÉSUMÉ

Introduction : Le diagnostic d'appendicite aiguë reste parfois difficile à poser. Parmi les présentations atypiques, existe la hernie d'Amyand. Il s'agit du développement d'une appendicite aiguë à l'intérieur d'une hernie abdominale. C'est une pathologie rare. Le diagnostic est per opératoire.

Observation: Il s'agissait de deux patients le premier avait 47 ans et le second âgé 03 mois, tous de sexe masculin. L'histoire clinique ne retrouvait pas des antécédents pathologiques notables. Ils étaient admis aux urgences chirurgicales pour tuméfactions inguino-scrotales, douloureuse, irréductible et non impulsive à la toux. Elle était à gauche pour le premier cas, et à droite pour le second. Il s'agissait d'une hernie inguino-scrotale étranglée. L'indication chirurgicale a été posée en urgence. A l'exploration, l'appendice et le cæcum ont été découverts dans les sacs. Le sujet âgé avait bénéficié d'une appendicectomie et d'une cure de la hernie selon Bassini. Les contenus ont été réintégrés chez le nourrisson. Les suites opératoires étaient simples.

Conclusion : La connaissance de cette pathologie rare est essentielle afin de permettre un diagnostic préopératoire et une prise en charge rapide et adéquate.

Mots clés: *hernie de Claudius d'Amyand, hernie inguino-scrotale, appendicectomie.*

SUMMARY

Background: The diagnosis of acute appendicitis sometimes remains difficult to make. Among the atypical presentations, there is Amyand's hernia. This is the development of acute appendicitis within an abdominal hernia. It is a rare pathology. The diagnosis is intraoperative.

Observation: There were two patients, the first was 47 years old and the second was 03 months old, all male. The clinical history did not reveal any notable pathological history. They were admitted to the surgical emergency room for inguinoscrotal swellings, painful, irreducible and not impulsive to cough. She was on the left for the first case, and on the right for the second. It was a strangulated inguinoscrotal hernia. The surgical indication was made urgently. On exploration, the appendix and cecum were discovered in the bags. The elderly subject had benefited from an appendectomy and hernia repair according to Bassini. The contents were reinstated in the infant. The postoperative course was simple. Conclusion: Knowledge of this rare pathology is essential to enable preoperative diagnosis and rapid and adequate management.

Conclusion: Knowledge of this rare pathology is essential to enable preoperative diagnosis and rapid and adequate treatment.

Keywords: *Claudius Amyand hernia, inguino-scrotal hernia, appendectomy.*

Tirés à part

MAMAN BOUKARI Haboubacar Service de Chirurgie Générale Centre Hospitalier Régional de Maradi/Niger, BP : 24,
 TEL : 20 410 220 Email : mamanboukarihaboubacar@gmail.com