

ARTICLE ORIGINAL

PANCRETATITES AIGUES EN MILIEU CHIRURGICAL AU CHU SO DE LOME

ACUTE PANCREATITIS IN THE SURGICAL SETTING AT CHU SO OF LOME

KA SAKIYE^{1,*}, TB ESSOBIYOU¹, F ALASSANI², BD BERBEKI¹, B TCHANGAI²

1. Service des urgences chirurgicales, Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, Lomé, TOGO

2. Service de Chirurgie Viscérale, Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, Lomé, TOGO

RÉSUMÉ

Objectif : décrire les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et évolutives des pancréatites aiguës en milieu chirurgical.

Méthodes : Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective monocentrique menée au CHU Sylvanus Olympio de Lomé (Togo) sur une période de 10 ans (janvier 2013 à décembre 2022).

Résultats : sur les 16 cas colligés, l'âge moyen des patients était de 42,7 ans avec une sex-ratio de 1,67. L'alcoolisme chronique avait été rapporté chez 04 patients. Le délai moyen de consultation était de $4,37 \pm 11,53$ jours. Les symptômes rencontrés étaient dominés par les douleurs (100%) et les vomissements (56,25%). Dans 9 cas (56,25%), la lipasémie était supérieure à 3 fois la moyenne. Le SRIS était transitoirement positif dans 25% des cas. Les PA bénignes (PA œdémateuses) représentaient 56,25 % (9 cas) et les PA nécrotico-hémorragiques 43,75 % (07 cas). La tomodensitométrie, réalisée chez 11 patients, retrouvaient majoritairement des lésions classées stade E de Balthazar. L'alcoolisme chronique était la principale étiologie rencontrée (25%). Sept patients avaient bénéficié d'un traitement chirurgical. La mortalité était de 18,75%, tandis que la morbidité était de 31,25%, dominée par les pseudokystes pancréatiques dans 2 cas et des épisodes de récurrences dans 03 cas.

Conclusion : urgences médico-chirurgicales, les pancréatites aiguës au CHU SO à Lomé, sont surtout d'étiologie alcoolique. Marquées par un retard de consultation, elles présentent également des difficultés de prise en charge liées à l'insuffisance du plateau technique. Ces pancréatites restent couplées à une morbi-mortalité importante.

Mots clés : urgence, médico-chirurgical, pancréatite, aigüe, traitement, chirurgical

SUMMARY

Objectif : Describe the epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary characteristics of acute pancreatitis in the surgical setting.

Methods : This was a single-centre retrospective descriptive study at the Sylvanus Olympio University Hospital in Lomé (Togo) over a 10-year period (January 2013 to December 2022).

Results : The mean age of the 16 cases was 42.7 years, with a sex ratio of 1.67. Chronic alcoholism was reported in 04 of the patients. The mean time spent consulting was 4.37 ± 11.53 days. Symptoms were dominated by pain (100%) and vomiting (56.25%). In 9 cases (56.25%), lipasemia was more than 3 times the mean value. The SRIS was transiently positive in 25% of cases. Benign APs (oedematous APs) accounted for 56.25% (9 cases) and necrotic-haemorrhagic APs for 43.75% (07 cases). CT scans, performed in 11 patients, showed mostly lesions classified as Balthazar stage E. Chronic alcoholism was the main aetiology (25%). Seven patients had undergone surgery. Mortality was 18.75%, while morbidity was 31.25%, dominated by pancreatic pseudocysts in 2 cases and recurrent episodes in 03 cases.

Conclusion : Acute pancreatitis at the CHU SO in Lomé is mainly of alcoholic origin. They are marked by a delay in consultation, and difficulties in management due to inadequate technical facilities. Pancreatitis is associated with a high mortality rate.

Keywords : emergency, medical-surgical, pancreatitis, acute, treatment, surgical

Tirés à part:

MCA SAKIYE Kodjo Abossisso Chirurgie générale et viscérale Urgences chirurgicales CHU S.O. de Lomé/ Togo
e-mail : sakiyeaboza@yahoo.fr tel (00228) 90183339