

FAIT CLINIQUE

RUPTURE POST-TRAUMATIQUE DU DIAPHRAGME AVEC HEMOTHORAX GAUCHE CHEZ UN ENFANT DE 9 ANS A L'HÔPITAL NATIONAL IGNACE DEEN, CHU DE CONAKRY

POST-TRAUMATIC DIAPHRAGM RUPTURE WITH LEFT HEMOTHORAX IN A 9-YEAR-OLD CHILD AT THE IGNACE DEEN NATIONAL HOSPITAL, CONAKRY CHU

MS DIALLO, A DIALLO, MS BANGOURA, A CONDÉ, DB KANTÉ, S DIAKITÉ, L SOUMAORO, A TOURÉ

Service de chirurgie générale, CHU Ignace Deen.

RÉSUMÉ

Introduction : Le but de ce rapport de cas était de décrire notre expérience de prise en charge dans notre contexte.

Observation : Il s'agissait d'un patient de 9 ans qui avait été admis aux urgences pour un traumatisme thoraco-abdominal et vertébro-médullaire suite à un accident domestique dont l'impact était violent. L'examen clinique avait révélé au niveau thoracique : un souffle vésiculaire présent dans le champ pulmonaire droit mais absent à gauche où il était remplacé par des bruits hydro-aériques. L'exploration avait mis en évidence une présence de viscères abdominaux dans l'hémithorax gauche. L'estomac, la rate, l'intestin grêle et le côlon transverse étaient aspirés dans le thorax à travers une brèche diaphragmatique de huit 8 cm environ.

Conclusion : Devant une morbi mortalité élevée de ce type de lésions traumatiques, la prise en charge doit être multidisciplinaire.

Mots clés : Rupture diaphragmatique, post-traumatique, hémithorax, Ignace Deen.

SUMMARY

Introduction: The aim of this case report was to describe our experience of care in our context.

Observation: This was a 9-year-old patient who had been admitted to the emergency room for thoraco-abdominal and vertebro-medullary trauma following a domestic accident with violent repercussions.

The clinical examination revealed at the thoracic level: a vesicular murmur present in the right pulmonary field but absent on the left where it was replaced by hydro-aeric sounds.

The exploration revealed the presence of abdominal viscera in the left hemithorax. The stomach, spleen, small intestine and transverse colon were aspirated into the thorax through a diaphragmatic breach of approximately eight to eight cm.

Conclusion: Given the high morbidity and mortality of this type of traumatic injury, management must be multidisciplinary.

Keywords: Diaphragmatic rupture, post-traumatic, hemothorax, Ignace Deen.

Tirés à part

DIALLO M. S.

Chirurgien généraliste au CHU d'Ignace Deen et assistant,
Mail: msad3008@gmail.com

chef de clinique à la FSTS/UGANC