

FAIT CLINIQUE

TRAITEMENT CHIRURGICAL DES ULCÈRES DUODÉNAUX HÉMORRAGIQUES EN MILIEUX TROPICAL : A PROPOS DE DEUX CAS TRAITÉS PAR LA MÉTHODE DE WEINBERG

SURGICAL TREATMENT OF HEMORRHAGIC DUODENAL ULCER IN TROPICAL ENVIRONMENTS: ABOUT TWO CASES TREATED BY THE WEINBERG METHOD

KT ASSOHOOUN, GM KOFFI, D BANGOURA, A SYLLA, MP SORO, KG SORO

Service de Chirurgie Générale et Digestive du CHU de Yopougon, UFR Sciences Médicales, Université Félix Houphouët Boigny Abidjan (Côte d'Ivoire)

RÉSUMÉ

La prise en charge des ulcères hémorragiques passe, en première intention, par un traitement endoscopique ou radiologique. Lorsque ces méthodes sont inefficaces ou inaccessibles, la chirurgie s'avère être la seule alternative pour juguler le saignement. À partir des cas, les auteurs rapportent la faisabilité du procédé de Weinberg dans la prise en charge des ulcères hémorragiques en urgence. Il s'agissait de deux patients de 31 et 42 ans observés aux urgences chirurgicales du CHU d'Angré ; qui ont été opérés en urgence pour des ulcères duodénaux hémorragiques cataclysmiques. Les suites opératoires ont été simples pour le premier patient, mais ont été émaillées d'une fistule duodénale chez le deuxième patient avec une évolution satisfaisante secondairement. La chirurgie constitue la seule alternative permettant de juguler l'hémorragie dans notre contexte actuel non encore aguerri en méthodes endoscopiques et radiologiques, tout en minimisant leur morbidité.

Mots clés: Duodénum- Ulcère- Hémorragie- Technique de Weinberg.

SUMMARY

The management of hemorrhagic ulcers involves, as first intention, endoscopic or radiological treatment. When these methods are ineffective or inaccessible, surgery proves to be the only alternative to stop the bleeding. Based on the cases, the authors report the feasibility of the Weinberg process in the management of emergency hemorrhagic ulcers. These were two patients aged 31 and 42 observed in the surgical emergency room of Angré University Hospital; who were operated on urgently for cataclysmic hemorrhagic duodenal ulcers. The postoperative course was simple for the first patient, but was marked by a duodenal fistula in the second patient with a satisfactory outcome afterwards. Surgery constitutes the only alternative to control hemorrhage in our current context which is not yet experienced in endoscopic and radiological methods, while minimizing their morbidity.

Keywords: Duodenum- Ulcer- Hemorrhage- Weinberg technique.

Tirés à part

Assohoun Krahboué Toussaint Hubert. Maître Assistant en Chirurgie Générale. 21 BP 4556 Abidjan - Côte d'Ivoire / Email: assohoun_toussaint@yahoo.fr