

FAIT CLINIQUE

CANCERS DU DUODENUM : A PROPOS DE DEUX CAS OBSERVES AU CHU SYLVANUS OLYMPIO DE LOME-TOGO

DUODENUM CACERS : TWO CASES REPORTED AT UNIVERSITY HOSPITAL OF SYLVANUS OLYMPIO OF LOME – TOGO

K BIGNANDI¹, T DARRE², DM SAMBIANI¹, B TCHANGAI¹, F ALASSANI¹, K KANASSOUA¹, S. DARE¹, DE DOSSEH¹

1. Service de Chirurgie Générale et Viscérale, CHU SO, Lomé, Togo.

2. Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques, CHU SO, Lomé, Togo

RÉSUMÉ

Objectifs : décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques, évolutives, pronostiques, histologiques de deux cas opérés de cancers du duodénum au CHU Sylvanus Olympio de Lomé entre 2012 et 2016.

Observations: il s'agissait d'un homme de 55 ans et d'une femme de 56 ans porteurs respectivement d'une tumeur au stade T2 sans métastase ni adénopathie, d'une tumeur T4 avec des adénopathies locorégionales et un envahissement vasculaire. La topographie a été respectivement les segments D2 et D3. Ils ont bénéficié d'une DPC pour le premier cas et d'une dérivation biliaire et digestive pour le second. Aucun patient n'a bénéficié d'un traitement complémentaire (chimiothérapie et / ou radiothérapie) faute de moyens financiers. Le suivi n'a pas noté de récurrence pour le 1er cas (jusqu'à 18 mois) et l'état clinique du second cas était satisfaisant (jusqu'à 6 mois). Sur le plan histologique, seul l'adénocarcinome a été retrouvé.

Conclusion : les cancers du duodénum sont rares au CHU Sylvanus Olympio, survenant le plus souvent chez des sujets âgés, dominés par l'adénocarcinome. Le pronostic est mauvais. Il pourrait en grande partie être amélioré par un dépistage précoce.

Mots clés : cancers duodénaux, épidémiologie, diagnostic, thérapeutique, évolution, pronostic, Lomé.

SUMMARY

Objectives: to describe the epidemiological, diagnostic, therapeutic, progressive, prognostic and histological aspects of two operated cases of duodenal cancer at the Sylvanus Olympio University Hospital in Lomé between 2012 and 2016.

Observations: It was a 55-year-old man and a 56-year-old woman with respectively a T2 tumor without metastasis or lymphadenopathy, and a T4 tumor with locoregional lymphadenopathy and vascular invasion. The topography was respectively the D2 and D3 segments. They received cephalic duodeno-pancreatectomy for the first case and biliary and digestive derivation for the second. No patient received additional treatment (chemotherapy and / or radiotherapy) due to a lack of financial means. The follow-up did not note a recurrence for the 1st case (up to 18 months) and the clinical condition of the second case was satisfactory (up to 6 months). Histologically, only adenocarcinoma was found.

Conclusion: Duodenal cancers are rare at the Sylvanus Olympio University Hospital, most often occurring in elderly subjects, dominated by adenocarcinoma. The prognosis is poor. It could largely be improved by early detection.

Keywords: duodenal cancers, epidemiology, diagnosis, therapy, evolution, prognosis, Lomé.

Tirés à part

BIGNANDI Kondo, Chirurgien généraliste, CHU Sylvanus Olympio E-mail : bikovebig11@yahoo.fr