

FAIT CLINIQUE

PERFORATION TRAUMATIQUE ISOLÉE DE LA VÉSICULE BILIAIRE

ISOLATED TRAUMATIC PERFORATION OF THE GALLBLADDER

B BENGALY^{1,2}, D TRAORÉ^{1,2}, S KANTÉ², M SISSOKO³, B TOGOLA^{1,2}, D OUATTARA², M COULIBALY⁴,
S SANOGO², L DIARRA⁵, N ONGOIBA^{1,2}

1. Faculté de médecine de l'USTTB, Bamako/MALI

2. Chirurgie B, CHU Point G, Bamako/MALI

3. Chirurgie A, CHU Point G, Bamako/MALI

4. Hôpital Koutiala/MALI

5. Hôpital dermatologique, Bamako/MALI

RÉSUMÉ

Introduction : L'atteinte isolée de la vésicule biliaire lors d'un traumatisme abdominal contondant est rare. Nous rapportons un cas de perforation isolée de la vésicule biliaire consécutive à un traumatisme fermé de l'abdomen suivi d'une revue de la littérature.

Observation : Il s'agissait d'un élève de 25 ans admis aux urgences du CHU Point G pour douleurs abdominales 3 jours après un accident de la circulation routière avec traumatisme fermé de l'abdomen. L'évolution 12 heures après son admission était marquée par l'installation d'un syndrome franc de péritonite aigue ayant motivé une laparotomie d'urgence ayant conduit à la découverte d'une perforation vésiculaire avec fuite biliaire. Le traitement a consisté à une cholécystectomie.

Conclusion : la perforation vésiculaire bien que rare, est possible dans les traumatismes abdominaux contondants. Des lésions minimales peuvent guérir sans complications, d'autres même graves donnent des manifestations tardives aggravant le pronostic.

Mots clés : *traumatisme contondant, abdomen, vésicule biliaire, perforation isolée*

SUMMARY

Introduction: Isolated gallbladder involvement in blunt abdominal trauma is rare. We report a case of isolated gallbladder perforation following closed abdominal trauma and review the literature.

Observation: A 25-year-old student was admitted to the Point G University Hospital emergency room for abdominal pain 3 days after a road traffic accident with closed abdominal trauma. The evolution 12 hours after his admission was marked by the development of a frank syndrome of acute peritonitis which motivated an emergency laparotomy leading to the discovery of a vesicular perforation with biliary leak. Treatment consisted of cholecystectomy.

Conclusion: Vesicular perforation, although rare, is possible in blunt abdominal trauma. Minimal lesions can heal without complications, others, even severe ones; give late manifestations aggravating the prognosis.

Keywords: *blunt trauma, abdomen, gallbladder, isolated perforation*

Tirés à part

Bréhima BENGALY, maître-assistant à la faculté de médecine de l'université des sciences, des techniques et Technologies de Bamako (USTTB), Praticien en chirurgie viscérale/générale dans le service de chirurgie B du CHU du Point G BP : 333 ; email : bengalybrehima@yahoo.fr ; Tel : (00223) 66982848 / 76208998