

FAIT CLINIQUE

STÉNOSE TARDIVE - COLOPLASTIE ŒSOPHAGIENNE AU CHU GABRIEL TOURE

LATE ESOPHAGOCOLOPLASTY STENOSIS AT CHU GABRIEL TOURE

A BAH¹, I DIAKITÉ¹, A MAIGA¹, Y SIDIBÉ¹, Z SAYE¹, A TRAORÉ¹, M KONATÉ¹, B KELLY¹, T KONÉ¹, B TRAORE³, M DIASSANA³, AA DOUMBIA¹, B KAREMBÉ¹, AA TRAORÉ¹, BT DEMBÉLÉ¹, KANTÉ¹, MI MANGANE², A ALMEIMOUNE², A TOGO¹

1 : Service de Chirurgie générale

2 : Service d'Anesthésie et réanimation

3 : Service de Chirurgie générale Hôpital du Mali

RÉSUMÉ

La coloplastie rétro sternale est la technique de choix pour rétablir la filière digestive en cas de séquelles sténosique de lésion bénigne de l'œsophage. Cette technique est souvent emmaillée de complications précoce et tardive parmi lesquelles la sténose qui se traduit par un syndrome occlusif haut à type de dysphagie, de vomissements post prandiaux précoces. Nous rapportons un cas de sténose tardive d'une coloplastie chez un sexagénaire après trois décennies. L'examen de confirmation a été le TOGD (transit oeso-gastro-duodénal) mettant en évidence une double sténose du transplant colique et de l'estomac.

Le traitement a consisté à une dilatation anastomotique et une gastro-entéro-anastomose iso péristaltique. Les suites opératoires ont été simples. Nous avons revu la littérature concernant l'étiologie, les caractéristiques cliniques et les options chirurgicales de cette complication.

Mots clés: œsophage - coloplastie - complication tardive - Mali.

SUMMARY

Retro-sternal coloplasty is the technique of choice for restoring the digestive system in the event of stenotic sequelae of benign lesion of the esophagus. This technique is often encrusted with early and late complications, including stenosis which results in a high occlusive syndrome like dysphagia, early postprandial vomiting. We report a case of late stenosis of a coloplasty in a sexagenarian after three decades. The confirmatory examination was the TOGD (eso-gastro-duodenal transit) showing double stenosis of the colonic transplant and of the stomach. Treatment consisted of anastomotic dilation and isoperistaltic gastroentero-anastomosis. The postoperative follow-up was straightforward. We reviewed the literature regarding the etiology, clinical features and surgical options of this complication.

Keywords: esophagus - coloplasty - late complication - Mali.

Tirés à part

Dr Amadou BAH, Chirurgien Praticien hospitalier au CHU Gabriel Toure Email : bah.amadouh@yahoo.fr