



FAIT CLINIQUE

PRÉSENTATION INHABITUELLE DE L'APPENDICE VERMIFORME DANS LE CANAL PÉRITONÉO-VAGINAL CHEZ L'ENFANT

UNUSUAL PRESENTATION OF THE VERMIFORM APPENDIX IN THE VAGINAL PERITONEAL DUCT IN CHILDREN

EUEM GOUDJO¹, CS METCHIHOUNGBÉ¹, DOED MIAFFO¹, AK MIHLUEDO-AGBOLAN¹, H KOCO¹, TB KANTÉ¹, YS SANNI¹, MA BOUMÉ², GK AKAKPO-NUMADO², K GNASSINGBÉ¹

1. Service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio de Lomé (Togo).
2. Service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Campus de Lomé (Togo).

RÉSUMÉ

La présence de l'appendice vermiforme inflammé ou non dans le sac d'une hernie inguinale ou canal péritonéo-vaginal chez l'enfant est appelée hernie d'Amyand. Il s'agit d'une situation rare. Les auteurs rapportent trois cas respectivement chez des enfants de 03 ans, de 14 ans et de 13 ans. Le diagnostic a été fait en peropératoire dans les trois cas. La prise en charge s'est basée sur les recommandations de la classification de Losanoff et Basson.

Mots clés: Canal péritonéo-vaginal, appendice vermiforme, Hernie d'Amyand, Enfant

SUMMARY

The presence of vermiform appendix, whether or not inflamed in the sac of an inguinal hernia or peritoneal-vaginal duct in children, is called Amyand's hernia. This is a rare situation. The authors report three cases in children of 3 years, 14 years and 13 years old respectively. The diagnosis was made intraoperatively in all three cases. The management was based on the recommendations of the Losanoff and Basson classification.

Keywords: Peritoneo-vaginal duct, vermiform appendix, Amyand's hernia, Child

Tirés à part

Dr Eudes Ulrich Elvis Mahougnon GOUDJO,

Chirurgien Pédiatre,

Email : goudjoeudes@yahoo.fr