



FAIT CLINIQUE

VOLVULUS DU COECUM : PRISE EN CHARGE D'UN CAS À L'HÔPITAL DE SECONDE RÉFÉRENCE " HÔPITAL DE TOMBOUCTOU" ET REVUE DE LA LITTÉRATURE

VOLVULUS OF COECUM: MANAGEMENT OF A CASE AT THE HOSPITAL OF SECOND REFERENCE "HOSPITAL OF TIMBUKTU" AND REVIEW OF THE LITERATURE

O ONGOÏBA¹, I TOUNKARA², J SAYE³, D KASSOGUÉ¹, A DIARRA⁴ , S THIAM⁵, B COULIBALY³, T TRAORÉ⁶, S MARIKO¹, A TOGO⁷

1- Hôpital régional de Tombouctou Mali
 2- Chirurgie générale du Centre de santé de référence de la commune II de Bamako Mali
 3- Chirurgie générale du Centre Hospitalier Universitaire du POINT G de Bamako Mali
 4- Chirurgie générale du Centre Hospitalier Universitaire de Kati Mali
 5- Hôpital régional de Gao Mali
 6- Hôpital régional de Sikasso Mali
 7- Chirurgie générale Centre Hospitalier Universitaire Gabriel TOURE de Bamako Mali

RÉSUMÉ

Le coecum est la deuxième partie du côlon concernée par le volvulus après le sigmoïde et avant l'angle colique gauche et le côlon transverse. Cette affection survient sur des coecums anormalement mobiles. Le mécanisme du volvulus est la torsion ou la bascule. Le tableau clinique est celui d'une occlusion intestinale par strangulation. L'abdomen sans préparation (ASP) et la tomodensitométrie abdominale sont les examens radiologiques de premier choix pour le diagnostic. Le traitement consiste en une chirurgie en urgence avec résection du coecum et de l'iléon terminal. Nous rapportons 1 cas de volvulus du coecum admis aux urgences dans un tableau d'occlusion intestinale aiguë, les examens complémentaires réalisés étaient une radiographie de l'abdomen sans préparation et une échographie abdominale et le traitement consistait en une résection iléocolique avec rétablissement immédiat de la continuité, les suites opératoires étaient simples.

Mots clés: *Volvulus coecum, chirurgie, "Hôpital de Tombouctou" au Mali*

SUMMARY

Coecum is the second part of the colon affected by volvulus after the sigmoid and before the left colic angle and the transverse colon. This condition occurs on abnormally mobile coecums. The mechanism of volvulus is twisting or tipping. The clinical picture is that of intestinal obstruction by strangulation. Unprepared abdomen (UPA) and abdominal CT scan are the first-choice radiological examinations for diagnosis. Treatment consists of emergency surgery with resection of coecum and terminal ileon. Treatment consists of emergency surgery with resection of coecum and terminal ileon. We report 1 case of coecum volvulus admitted to the emergency room in an acute intestinal occlusion chart, the further examinations performed were an x-ray of the abdomen without preparation and an abdominal ultrasound and treatment consisted of an ileocolic resection with immediate re-establishment of continuity, the surgical suites were simple.

Keywords: *Volvulus coecum without necrosis, anastomosis resection, "Hospital of Timbuktu" in Mali*

Tirés à part

Oumar Ongoïba, chirurgien à l'hôpital de seconde référence " Hôpital de Tombouctou" au Mali
 Email : babaongoiba@gmail.com