

ARTICLE ORIGINAL

MORBIDITE ET MORTALITE DES PERITONITES APPENDICULAIRES AIGUES GENERALISEES AU CHU DE BOUAKE

MORBIDITY AND MORTALITY OF ACUTE GENERALIZED APPENDICULAR PERITONITIS AT THE BOUAKE HOSPITAL

M TRAORÉ, KI ANZOUA, KB KOUAKOU, KI LEH BI, AB N'DRI, AS EKRA, BA KOUAKOU, I BAMBA, E AKOWENDO, S COULIBALY, R LEBEAU, B DIANÉ

Service de chirurgie générale et digestive, Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké

RÉSUMÉ

Introduction : les péritonites appendiculaires sont encore fréquentes dans notre pratique avec des complications non négligeables. Le but était d'analyser la morbidité et la mortalité des péritonites généralisées d'origine appendiculaire.

Patients et méthodes : étude rétrospective descriptive et analytique de janvier 2012 à décembre 2023 portant sur 269 patients opérés d'une péritonite généralisée appendiculaire au CHU de Bouaké.

Résultats : la morbidité était de 21,9% (n=59) avec une prédominance de la suppuration pariétale dans 18,6% (n=50). Nous avons noté 3 décès soit une mortalité était de 1,1%. Les décès étaient dus au choc septique. Le facteur de risque de survenue de décès noté était le délai de consultation de plus de 72 heures. La durée moyenne d'hospitalisation était de $6,5 \pm 3,5$ jours.

Conclusion : les péritonites appendiculaires ont une morbi-mortalité encore. Le retard de consultation est un facteur de risque de décès d'où l'intérêt d'une consultation et une prise en charge précoce.

Mots clés : péritonites appendiculaires généralisée, morbidité, mortalité.

SUMMARY

Introduction: appendicular peritonitis is still common in our practice with significant complications. The aim was to analyze the morbidity and mortality of generalized peritonitis of appendicular origin.

Patients and methods: retrospective descriptive and analytical study from January 2012 to December 2023 involving 269 patients operated on for generalized appendicular peritonitis at the Bouake University Hospital.

Results: morbidity was 21.9% (n=59) with a predominance of parietal suppuration in 18.6% (n=50). We noted 3 deaths, i.e. mortality was 1.1%. Deaths were due to septic shock. The risk factor for the occurrence of death noted was the consultation delay of more than 72 hours. The average length of hospitalization was 6.5 ± 3.5 days.

Conclusion: appendicular peritonitis still has morbidity and mortality. Delay in consultation is a risk factor for death, hence the importance of consultation and early treatment.

Keywords: generalized appendicular peritonitis, morbidity, mortality

Tirés à part:

TRAORE Mamadou.

Service de chirurgie générale et digestive du CHU de Bouaké.

Tel: +2250707464050

Email : traorefallstam2000@yahoo.fr