

ARTICLE ORIGINAL

CANCERS COLIQUES EN OCCLUSION. A PROPOS DE 39 CAS COLLIGES ENTRE 2019 ET 2024 AUX URGENCES VISCÉRALES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO (CHUYO).

COLONIC CANCER IN OCCLUSION. ABOUT 39 CASES FROM 2019 TO 2024 IN THE VISCERAL EMERGENCY OR YALGADO OUEDRAOGO TEACHING HOSPITAL

AH BAGUE, CRT KOUCHIKA, A DJIGUEMDE, S COMPAORE, N ZONGO, E OUANGRE

Service de chirurgie générale et digestive du CHU Yalgadogo OUEDRAOGO, Burkina Faso

RÉSUMÉ

Objectif : Décrire la démarche diagnostique et les modalités thérapeutiques des occlusions coliques par cancer au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo.

Patients et méthode : Il s'est agi d'une étude rétrospective réalisée sur cinq ans aux urgences viscérales du CHU Yalgado Ouédraogo. Nous avons pris en compte les aspects socio-démographiques, les aspects cliniques et paracliniques, les gestes chirurgicaux et les suites opératoires.

Résultats : Nous avons colligé 39 occlusions coliques par cancer. Les hommes représentaient 21 cas et les femmes 18 cas. L'âge moyen des patients était de 48 ans avec des extrêmes de 21 ans et 79 ans. Des antécédents de constipations ou de diarrhées ont été notés dans tous les cas. Tous les patients ont présenté un syndrome occlusif d'installation progressive. L'altération de l'état générale a été retrouvée chez 22 cas. La radiographie de l'abdomen sans préparation a objectivé des niveaux hydroaériques plus haut que larges. L'intervention de Hartmann a été la technique de choix dans les occlusions par cancers du côlon sigmoïde (30,7%). L'hémicolectomie droite avec anastomose iléo-colique a été réalisée dans les cancers du côlon droit. Les suites postopératoires immédiates ont été simples. Deux patients ont bénéficié de la chimiothérapie. Deux décès postopératoires ont été notés.

Conclusion : les occlusions par cancers sont fréquentes. L'hémicolectomie est le geste le plus réalisé. Une sensibilisation contre les cancers digestifs permettrait un diagnostic précoce et réduira les découvertes devant des complications comme les occlusions intestinales.

Mots clés : cancer colique - occlusion - urgence chirurgicale - hémicolectomie.

SUMMARY

Objective: To describe the diagnostic approach and treatment modalities for colonic obstructions due to cancer at the Yalgado Ouedraogo teaching hospital.

Patients and method: it was about a retrospective cross sectional study conducted over five years in the visceral emergency's department of Yalgado Ouedraogo teaching Hospital. were taken into account socio-demographic, clinical, and paraclinical aspects, surgical procedures, and postoperative outcomes.

Results : We collected data on 39 cases of cancer-related colonic obstruction. The sex ratio was 1,7. The average age of patients was 48 years, ranging from 21 to 79 years. A history of constipation or diarrhea was noted in all cases. All patients presented with a progressively developing occlusive syndrome. A deterioration in general condition was found in 22 cases. Abdominal X-rays without preparation revealed hydroaerial levels that were higher than they were wide. Hartmann's procedure was the technique of choice in cases of obstruction due to sigmoid colon cancer (30.7%). Right hemicolectomy with ileo-colonic anastomosis was performed in cases of right colon cancer. The immediate postoperative period was uneventful. Two patients received chemotherapy. Two postoperative deaths were noted.

Conclusion: Cancer-related obstructions are common. Hemicolectomy is the most commonly performed procedure. Awareness on digestive cancers's early diagnosis may contribute to decrease complicated cases.

Keywords: colon cancer - obstruction - surgical emergency - hemicolectomy.

Tirés à part:

Dr Abdoul Halim Bagué, Chirurgien Cancérologue, CHU Yalgado OUEDRAOGO, Email: halimbagq@yahoo.fr, tel : 0022676149904