

FAIT CLINIQUE

ENDOMÉTRIOSE DE LA PAROI ABDOMINALE POST CÉSARIENNE : À PROPOS D'UN CAS

ABDOMINAL WALL ENDOMETRIOSIS: ABOUT ONE CASE

N KEÏTA¹, JDD SANOU², N YABRÉ¹, MUG TAPSOBA³, LGH BELEMLIGA¹, C ZARE¹

1Service de Chirurgie Générale et Viscérale ; département de chirurgie, Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

2Département de Gynécologie d'Obstétrique et de Médecine de la Reproduction, Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

3Service d'imagerie médicale Centre Hospitalier Universitaire Sourô SANOU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

RÉSUMÉ

L'endométriose cicatricielle de la paroi abdominale est rare. Sa localisation sur une cicatrice de césarienne a été décrite. Sa physiopathologie reste imprécise, mais l'hypothèse d'une greffe cellulaire in situ lors de l'ouverture des espaces musculo-aponévrotiques après hystérotomie est admise. L'association d'une masse cicatricielle plus ou moins algique avec des douleurs cycliques est évocatrice du diagnostic. La confirmation diagnostique est histologique et l'exérèse chirurgicale large reste le traitement de choix. Nous rapportons un cas d'endométriose sur une cicatrice de Pfannenstiel post césarienne, chez une patiente de 27 ans, parité un et gesticité un ; ayant bénéficiée d'une exérèse chirurgicale, et une guérison complète avec un recul de neuf mois.

Mots clés: Endométriose – Cicatrice – Paroi abdominale – Chirurgie

SUMMARY

Cicatricial endometriosis of the abdominal wall is rare. Its location on a cesarean section scar has been described. Its pathophysiology remains unclear, but the hypothesis of an in situ cell graft during the opening of the musculoaponeurotic spaces after hysterotomy is accepted. The association of a more or less painful scar mass with cyclical pain is suggestive of the diagnosis. Diagnostic confirmation is histological, and wide surgical excision remains the treatment of choice. We report a case of endometriosis on a post-cesarean Pfannenstiel scar in a 27-year-old patient, parity1 and geste1; who underwent surgical excision and achieved complete healing after nine months of follow-up.

Keywords: Endometriosis – Scar – Abdominal wall – Surgery

Tirés à part

KEITA Namori, Service de Chirurgie Générale et Viscérale, CHUSS Bobo-Dioulasso Burkina Faso. Email : borikeita@yahoo.fr ; Téléphone : +226 60824744 ; +22657465933.