

FAIT CLINIQUE

PERFORATION GASTRIQUE CHEZ L'ENFANT : A PROPOS DE DEUX CAS AU CHR DAPAONG (TOGO)

GASTRIC PERFORATION IN CHILDREN: TWO CASES AT THE DAPAONG CHR (TOGO)

T DOSSOUVI¹, A FOLLY², A SAKIYE³, A AMAVI³, M FOADEY⁴, EG AMOUZOU⁵, K KANASSOUA⁵, I KASSEGNÉ⁶, ED DOSSEH³

1- Service de Chirurgie Générale et Digestive, Centre Hospitalier Régional de Dapaong/Togo

2- Service de Chirurgie pédiatrique, Centre Hospitalier Universitaire de Kara/Togo

3- Service de Chirurgie Générale et Digestive, Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio de Lomé /Togo

4- Service de Chirurgie Générale et Digestive, Centre Hospitalier Régional de Sokodé/Togo

5- Service de Chirurgie Générale et Digestive, Centre Hospitalier Universitaire de Kara/Togo

6- Service de Chirurgie Générale et Digestive, Centre Hospitalier Régional de Kara/Togo

RÉSUMÉ

La perforation gastrique chez l'enfant est une entité pathologique rare. Une panoplie de mécanismes permettent d'expliquer la survenue de cette pathologie chez l'enfant. Il existe deux formes : la forme néonatale est le plus souvent spontanée d'origine malformative et celle post-néonatale est secondaire à une affection. Nous rapportons deux cas de perforation gastrique dont une chez un nouveau-né à terme et l'autre chez un enfant de 3 ans. Les deux patients ont été admis dans un tableau d'irritation péritonéale. La radiographie de l'abdomen sans préparation a permis de mettre en évidence un pneumopéritoine. Une péritonite par perforation d'un organe creux a été évoquée. Une laparotomie réalisée a retrouvé une perforation gastrique au niveau de la grosse courbure gastrique chez le nouveau-né et une perforation antrale chez l'enfant. Une excision-suture a été réalisée dans les deux cas. Les suites opératoires ont été simples.

Mots clés: perforation gastrique; nouveau-né; enfant; Togo.

SUMMARY

Gastric perforation in children is a rare pathological entity. A range of mechanisms can explain the occurrence of this pathology in children. There are two forms: the neonatal form is most often spontaneous of malformation origin and the post-neonatal form is secondary to an illness. We report two cases of gastric perforation, one in a full-term newborn and the other in a 3-year-old child. Both patients were admitted with peritoneal irritation. Abdominal X-Ray revealed pneumoperitoneum in the two cases. A laparotomy revealed a gastric perforation at the greater curvature of the stomach in the newborn and an antral perforation in the child. An excision-suture was performed in both cases. The postoperative outcome was good.

Keywords: gastric perforation; newborn; child; Togo.

Tirés à part

Dr Tamegnon DOSSOUVI ;

Chirurgien au CHR Dapaong ;

E-mail : dboris@ymail.com